

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην κάνετε τη θεραπεία όταν υπάρχει :

- ο Θετική αντίδραση σε τεστ αλλεργίας. Το τεστ πρέπει να γίνεται 24 ώρες πριν από τη διαδικασία
- ο Κύστες (Μια κύστη είναι ένα κομμάτι του άνω ή κάτω βλεφάρου που προκαλείται από την απόφραξη και την κατακρήμνιση ενός αδένου του οφθαλμικού καλύμματος - επίσης γνωστή ως μεσοβιακή ή γάγγλιο, χαλάζιο ή κοκκίωμα κύστη.)
- ο Κριθαράκι στο βλέφαρο (είναι συχνά αποτέλεσμα μόλυνσης από το βακτήριο του σταφυλόκοκκου)
- ο Βλεφαρίτιδα (είναι μια οφθαλμική πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή του βλεφάρου)
- ο Χημειοθεραπεία
- ο Δερματική ασθένεια, τραύμα του δέρματος, κοψίματα, εκδορές, εγκαύματα και πρήξιμο στην περιοχή του ματιού
- ο Δερματικές παθήσεις στη γενική περιοχή των ματιών (Dermatitis, Xanthelasma & Syringoma)
- ο Οφθαλμικές λοιμώξεις όπως η επιπεφυκίτιδα
- ο Φλεγμονές των ματιών, όπως η ραγοειδίτιδα
- ο Πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις στα μάτια και γύρω περιοχή, στο κεφάλι ή στο πρόσωπο ή έντονες ουλές στη περιοχή.
- ο Υγρά μάτια
- ο Υπερευαίσθητο δέρμα / μάτια
- ο Κερατίτιδες
- ο Αλωπεκία (απώλεια μαλλιών)
- ο Trichotillomania (μια διαταραχή ελέγχου η οποία είναι η καταναγκαστική ώθηση οπου ο παθών βγάζει τα μαλλιά του από τη ρίζα)
- ο Παράλυση Bell ή οποιαδήποτε πάθηση που κάνει δύσκολο το κλείσιμο ή το άνοιγμα των οφθαλμών
- ο Οποιαδήποτε ασθένεια / διαταραχή που προκαλεί ανατάραξη, σπασμωδικές κινήσεις ή διαταραχές
- ο Καταστραμμένες , εύθραυστές βλεφαρίδες

Απαιτείται συμβουλή ιατρού :

- Σύνδρομο ξηροφθαλμίας
- Γλαύκωμα/ Καταράκτης
- Μετά τη χημειοθεραπεία

Ειδικές περιπτώσεις ;

- Κλειστοφοβία : ο πελάτης δεν πρέπει να ανοίγει τα μάτια του κατά τη διάρκεια της θεραπείας .
- Αλλεργική ρινίτιδα: τα μάτια μπορούν να είναι υγρά, υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουν τα προϊόντα στα μάτια

ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μπορούν να φορεθούν ξανά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας